

Prélèvements de bouses dans l'environnement

Fiche à joindre aux prélèvements

CHEPTEL N° 61 _____ Nom _____ Adresse _____

Vétérinaire préleveur Nom _____ Cabinet _____

Date _____ BOVIN OVIN/CAPRIN

Contexte d'utilisation :

- Paratuberculose : à réaliser le jour des prélèvements sérologiques pour **tous les cheptels en plan paratuberculose (laitiers et allaitants)** et à la demande, par exemple suite aux résultats des analyses de mélange (lait de tank, sérums de mélange).
- Salmonelloses : à la demande, par exemple après une suspicion. Permet d'identifier le sérotype présent et de quantifier le niveau de contamination de l'élevage.

Flacon N°	Site prélevé (préciser)*
1	
2	
3	
4	

Cochez la ou les case(s) correspondante(s) à la demande

sur mélange des 4 prélèvements	
Salmonelloses (PCR) <input type="checkbox"/> + <i>Culture/Sérotypage si positif</i>	Paratuberculose (PCR) <input type="checkbox"/>

Matériel : 4 pots à bouchon rouge GM, 4 gants de fouille (1 par pot) NB : les échantillons doivent être mis dans le pot et non laissés dans le gant

Méthode : prélèvement sur 4 sites avec à chaque fois 4 prélèvements.

- * **Sites** : Aire d'attente de la salle de traite (allaitants = aire paillée)
 Aire de raclage
 Fumière
 Box de vêlage ou box vaches taries

Prélèvements : 4 prélèvements d'environ 30 g chacun sur le même site.

Identification : Noter le numéro de prélèvement (1-2-3-4) au feutre indélébile sur le flacon placer les 4 flacons dans une pochette avec inscription du numéro de cheptel.

Acheminement : Respect de la chaîne du froid et acheminement rapide au LABÉO **accompagné de l'original de la présente fiche. (<96h impératif pour Salmonelle)**

Coût prélèvement : Charge éleveur

Coût analyse adhérent GDS: 10€ par analyse – **ATTENTION : participation GDS uniquement si fiche jointe aux prélèvements**

(1 exemplaire à joindre à l'envoi au LABÉO 1 ex éleveur 1 ex vétérinaire)